

一.单选题(180分,每题1.5分)

1. 下列哪一项不属于护理专业特征

- A. 以为人类服务为目的
- B. 有完善的教育体制
- C. 有系统而坚实的专业理论基础
- D. 有良好的科研体系
- E. 有专业自主性

2. 下列哪一项是影响健康的主要因素

- A. 心理因素
- B. 生物因素
- C. 环境因素
- D. 社会因素
- E. 文化因素

3. “2000年人人享有卫生保健”的战略目标的提出者是

- A. 联合国
- B. WHO
- C. 国务院
- D. 全国人大
- E. 卫生部

4. “一般适应综合征”首先是由以下哪种学说提出的

- A. 席尔的压力与适应学说
- B. 拉扎勒斯的压力与应对学说
- C. 霍姆斯的生活事件与疾病关系学说
- D. 拉赫的生活事件与疾病关系学说
- E. 伯纳德的应激反应学说

5. 人际关系双方的心理方位在角色行为体现上具有明显的上下位之分,旁观者能迅速分辨,称为

- A. 完全性心理方位
- B. 内隐性心理方位

C. 服从性心理方位

D. 权威性心理方位

E. 外显型心理方位

6. 人际间最传神的非语言沟通的表现形式是:

- A. 面部表情
- B. 着装
- C. 眼神
- D. 身体姿势
- E. 环境安排

7. 病人入院后护士收集资料的过程,不妥的做法是

- A. 通过病人的主诉获得主观资料
- B. 通过与病人交谈获得病史资料
- C. 通过观察病人非语言行为获得客观资料
- D. 通过医生病历获得体检资料
- E. 通过阅读实验室报告获得检验结果

8. 在护理计划中,预期目标陈述的是

- A. 护理活动所应达到的程度
- B. 病人健康状况所应达到的程度
- C. 家属对病人的支持程度
- D. 医疗活动所应达到的水平
- E. 护理部领导的管理水平

9. 下列关于马林诺斯基对文化功能的阐述正确的是

- A. 文化不能解释社会的规范体系
- B. 文化使各个群体利益更加冲突
- C. 世界历史进程可完全被当时的文化所表现
- D. 文化是各民族相互区分的标志
- E. 文化是民族社会发展的外在动力

10. 华森的关怀科学模式的核心内容是

- A. 早期诊断
B. 早期治疗
C. 康复锻炼
D. 人性关怀
E. 健康教育
11. “功能制护理”的大力推行是受以下哪种护理哲学思潮的影响
A. 禁欲主义
B. 浪漫主义
C. 实用主义
D. 人本主义
E. 存在主义
12. 健康促进模式(HPM)的提出者是
A. 霍克巴姆
B. 贝克
C. 伦斯·格林
D. 勒·潘德
E. 恩格尔
13. 下列病室通风的目的中不合适的是
A. 保持空气的新鲜
B. 调节室内的温度和湿度
C. 降低空气中的微生物的密度
D. 减少热量散失
E. 使患者精神振奋、心情愉快
14. 下列关于光线对人的作用不正确的是
A. 红外线能被皮肤吸收,使皮肤及深部组织受到温热作用
B. 适量的日光照射,使人食欲增加,舒适愉快
C. 紫外线有强大的杀菌作用
D. 可见光、红外线、紫外线及各种射线都有很强的生物学作用
E. 光线对人的心理无作用
15. 被套式备用床的被头边缘与床头的距离是
A. 10cm
B. 15cm
C. 20cm
D. 25cm
E. 30cm
16. 二人搬运患者的正确方法是
A. 甲托背部,乙托臀部
B. 甲托头部,乙托臀部
C. 甲托头、背部,乙托臀、膝部
D. 甲托头、颈、肩、腰部,乙托臀、膝部
E. 甲托头、肩部,乙托臀、膝部
17. 不需要使用保护具的患者为
A. 分娩后产妇
B. 昏迷
C. 高热
D. 躁动
E. 谵妄
18. 椎管内麻醉后须去枕平卧 6 小时,其目的为
A. 改善脑部血液循环
B. 预防脑压降低
C. 预防脑部感染
D. 预防脑缺血
E. 预防血压降低
19. 以下哪种患者不适宜床上擦浴
A. 使用石膏固定的患者
B. 衰竭的患者
C. 传染病患者
D. 使用牵引的患者
E. 无法自行沐浴的患者

20. 导致压疮发生的最常见原因是
- 皮肤受到潮湿物的刺激
 - 年龄因素
 - 压力因素
 - 营养状况
 - 体温升高
21. 下列关于慢波睡眠的描述,正确的是
- 慢波睡眠分为五个时期
 - 入睡期是所有睡眠期中睡得最浅的一期
 - 浅睡期只维持几分钟
 - 中度睡眠期生命体征不规则
 - 深度睡眠期不利于促进体力恢复
22. 下列关于快波睡眠的描述,正确的是
- 与慢波睡眠相比,快波睡眠的唤醒阈降低
 - 脑耗氧量及脑血流量降低
 - 生长激素分泌增多
 - 快波睡眠期不会做梦
 - 快波睡眠与觉醒时很难区分
23. 不适合用于压力蒸汽灭菌的物品是
- 油剂
 - 搪瓷物品
 - 玻璃器皿
 - 金属制品
 - 纤维织物
24. 热力消毒灭菌法中效果最好的是
- 燃烧法
 - 干烤法
 - 煮沸法
 - 高压蒸气灭菌法
 - 流通蒸气灭菌法
25. 正确使用无菌持物钳的方法是
- 门诊换药室的无菌持物钳应每周消毒一次
 - 始终保持钳端向上,不可跨越无菌区
 - 取放持物钳时不可触及容器壁
 - 到远处取物应速去速回
 - 可以夹取任何无菌物品
26. 取用无菌溶液时,先倒出少许溶液是为了
- 冲洗瓶口
 - 检查溶液的颜色
 - 冲洗无菌容器
 - 检查溶液有无污染
 - 检查溶液有无浑浊
27. 心包积液患者常见的脉搏是
- 水冲脉
 - 绌脉
 - 奇脉
 - 交替脉
 - 细脉
28. 检查血压计时关紧活门充气,如汞柱不能上升,可能为
- 袖带太松
 - 袖带太紧
 - 袖带太宽
 - 袖带太窄
 - 漏气
29. 乙醇拭浴后,体温降至何值应取下头部冰袋
- 37.5℃
 - 38.0℃
 - 38.5℃
 - 39.0℃
 - 39.5℃

30. 化学加热袋的最高温度可达
- 46℃
 - 56℃
 - 66℃
 - 76℃
 - 86℃
31. 冷疗法的生理效应是
- 细胞代谢减少
 - 毛细血管通透性增加
 - 血管扩张
 - 需氧量增加
 - 血液流动增快
32. 流质饮食不宜长期使用是因为
- 影响病人食欲
 - 影响消化吸收
 - 增加护士工作负担
 - 增加营养室工作负担
 - 所含热量及营养素不足
33. 多尿是指 24 小时尿量超过
- 1000ml
 - 1600ml
 - 1800ml
 - 2000ml
 - 2500ml
34. 发挥药效最快的给药途径是
- 口服
 - 外敷
 - 吸入
 - 皮下注射
 - 静脉注射
35. 输液引起急性循环负荷过重(肺水肿)的特
征性症状是
- 咳嗽、呼吸困难
 - 心慌、恶心、呕吐
 - 发绀、烦躁不安
 - 咳嗽、咳粉红色泡沫性痰、气促、胸闷
 - 胸闷、心悸伴呼吸困难
36. 意识完全丧失,对各种刺激均无反应,全身
肌肉松弛,深浅反射均消失,此时患者处于
- 嗜睡
 - 意识模糊
 - 昏睡
 - 浅昏迷
 - 深昏迷
37. 患者男性,60 岁。诊断为慢性阻塞性肺疾
病。现需判断患者气流受限情况,应采取的
检查是
- 痰培养
 - 血细胞计数
 - 肺功能检查
 - 影像学检查
 - 动脉血气分析
38. 患者男性,40 岁。体检时胸部 X 线显示右
侧胸腔有大量积液。此时应首选的检查是
- 肺功能测定
 - 胸腔穿刺术
 - 动脉血气分析
 - 放射性核素检查
 - 纤维支气管镜检查
39. 影响血流阻力的主要因素是
- 毛细血管口径
 - 小动脉和微动脉口径
 - 血液黏滞性

- D. 动脉管壁弹性
E. 心脏收缩力
40. 患者,男性,68岁。刺激性咳嗽3周,经抗生素治疗未缓解。胸部X线显示右肺有原因不明的阴影,此时应进一步检查下列哪一项
- A. 肺功能测定
B. 胸腔穿刺术
C. 动脉血气分析
D. 放射性核素检查
E. 纤维支气管镜检查
41. 患者,男性,70岁。诊断为慢性阻塞性肺气肿,其最可能出现的酸碱失衡是
- A. 代谢性酸中毒
B. 代谢性碱中毒
C. 呼吸性酸中毒
D. 呼吸性碱中毒
E. 代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒
42. 患者,女性,25岁。诊断哮喘5年。近年来每当春季给花园除草后即出现咳嗽、咳痰伴哮喘发作,其可能的过敏原是
- A. 花粉
B. 尘螨
C. 寄生虫
D. 病毒感染
E. 细菌感染
43. 患者,男性,50岁。近1个月来干咳,伴有低热、盗汗,自觉乏力。拟诊肺结核,为进一步明确诊断,最重要的检查是
- A. 痰菌检查
B. 胸部CT检查
C. 痰细胞学检查
D. 支气管碘油造影
E. 纤维支气管镜检查
44. 某女性患者,因心力衰竭需限制钠盐摄入,病人不可过多使用的调味品是
- A. 味精
B. 黄酒
C. 蒜
D. 番茄酱
E. 米醋
45. 患者,男性,68岁。间断性心前区疼痛1个月,多在夜间发作,与活动无关,每次发作15分钟,发作时心电图II、III、aVF导联ST段抬高。最可能的诊断为
- A. 稳定型心绞痛
B. 恶化型心绞痛
C. 急性心肌梗死
D. 变异型心绞痛
E. 卧位型心绞痛
46. 自身免疫性胃炎引起恶性贫血的原因是
- A. 红细胞遭到破坏
B. 药物副作用
C. 缺乏叶酸
D. 影响铁的吸收
E. 维生素B₁₂吸收不良
47. 患者,男性,46岁。诊断为“上消化道出血”收住院,为明确出血病因,首选的检查方法是
- A. 大便隐血试验
B. X线钡剂造影
C. 内镜检查
D. 血常规检查
E. B超检查
48. 患者,女性,38岁。患乙肝近10年,去年确

- 诊为肝硬化。近来常有鼻出血、牙龈出血。出血的主要原因是
- 肝脏合成凝血因子减少
 - 脾功能亢进
 - 毛细血管脆性增加
 - 血小板缺乏
 - 血小板功能障碍
49. 由肾脏产生的最终合成血管紧张素 II 的激素是
- 肾素
 - 促红细胞生成素
 - 前列腺素
 - 激肽类
 - 缓激肽
50. 特发性血小板减少性紫癜的发病机制主要是
- 骨髓造血功能破坏
 - 血小板抗体的存在
 - 小血管炎性反应
 - 凝血因子的缺乏
 - 血小板生成抑制
51. 处于活动期的系统性红斑狼疮患者其辅助检查可能出现
- 血沉降低
 - 免疫球蛋白降低
 - 血清补体 C3 增多
 - 抗核抗体定量降低
 - 皮肤狼疮带试验阳性
52. 患者,女性,45 岁。患类风湿关节炎 12 年。3 天前再次出现双手腕肿痛。下列检查中,提示患者病情活动的指标是
- 血沉偏低
 - C 反应蛋白增高
 - 关节腔滑液增多
 - 血常规示轻度贫血
 - 关节 X 线检查示关节端骨质疏松
53. COPD 患者,中老年,体弱,痰量较多者,应避免使用
- 祛痰药
 - 抗生素
 - 解痉药
 - 平喘药
 - 强烈镇咳剂
54. 肺源性心脏病急性加重期的治疗关键是
- 补液
 - 低流量吸氧
 - 纠正电解质紊乱
 - 使用呼吸机改善通气状况
 - 控制感染,解除支气管痉挛,改善通气功能
55. 患者,男性,15 岁。平素体健,每于剧烈运动后出现胸闷、咳嗽和呼吸困难。其最可能的诊断是
- 运动性哮喘
 - 支气管扩张
 - 急性支气管炎
 - 慢性支气管炎
 - 咳嗽变异性哮喘
56. 患者,女性,36 岁。咳嗽 1 月余,伴低热、痰中带血 10 天。全胸片示:右肺上叶尖段炎症,伴有空洞形成。最可能的诊断是
- 肺脓肿
 - 支气管扩张
 - 浸润型肺结核

- D. 癌性空洞伴感染
E. 金黄色葡萄球菌肺炎
57. 患者,女性,47岁。确诊肺脓肿后经抗生素治疗3个月,仍咳脓痰,X线片显示脓腔直径6cm。下一步治疗应首先考虑
- A. 手术治疗
B. 加强体位引流
C. 中医中药治疗
D. 加大抗生素用量
E. 气管内滴注抗生素
58. 在心尖区触及舒张期震颤可见于
- A. 主动脉瓣狭窄
B. 肺动脉瓣狭窄
C. 二尖瓣狭窄
D. 动脉导管未闭
E. 二尖瓣关闭不全
59. 对三度房室传导阻滞反复发作,并伴有阿-斯综合征者,首选的治疗是
- A. 糖皮质激素
B. 阿托品
C. 异丙肾上腺素
D. 安置人工心脏起搏器
E. 麻黄碱
60. 电复律治疗术后护理中不恰当的是
- A. 持续24小时心电监护
B. 按医嘱服用抗心律失常药
C. 常规低流量吸氧
D. 禁食至清醒后两小时
E. 术后应立即下床活动
61. 根据原发性高血压危险的分层,属于高危危险组的是
- A. 高血压1级,不伴有危险因素者
B. 高血压1级伴1~2个危险因素者
C. 高血压2级不伴或伴有不超过2个危险因素者
D. 高血压3级伴至少3个危险因素者
E. 高血压1~2级伴靶器官损害及相关的临床疾病者
62. 对安装人工起搏器患者的护理中,不正确的是
- A. 持续24小时心电监护
B. 平卧24小时,术侧卧位
C. 术后第4天开始协助患者做术侧肩部活动
D. 沙袋压迫伤口4~6小时
E. 遵医嘱给予抗生素3天
63. 接受降压药物治疗的高血压患者,起床时晕倒,片刻后清醒,首先考虑是
- A. 心源性休克
B. 高血压危象
C. 高血压脑病
D. 急性左心衰竭
E. 体位性低血压
64. 一位急性心肌梗死患者心电监护时发现一提前出现的宽大畸形QRS波群,T波与QRS波主波方向相反,你认为此提前出现的QRS波群最可能是
- A. 窦性心律不齐
B. 房性期前收缩
C. 交界区期前收缩
D. 室性期前收缩
E. 正常现象
65. 出血坏死型胰腺炎患者出现Cullen征是指

- A. 黄疸加重
B. 背部皮肤青紫
C. 腰部两侧出现灰紫色淤斑
D. 脐周皮肤红斑
E. 脐周出现皮肤青紫
66. 质子泵抑制剂用于上消化道出血的主要机制是
A. 使局部血管收缩
B. 促进凝血因子的作用
C. 促进血小板的生成
D. 促进胃酸分泌,降低胃液 pH
E. 抑制胃酸分泌,提高胃液 pH
67. 患者,男性,37岁。有溃疡病史。中午饱餐后出现上腹剧烈疼痛,伴恶心、呕吐。腹肌紧张,出冷汗,休克。首先应考虑并发症是
A. 癌变
B. 感染
C. 大出血
D. 急性穿孔
E. 幽门梗阻
68. 关于糖尿病酮症酸中毒的描述正确的是
A. 多发于老年,常无糖尿病史,常有感染、呕吐、腹泻等病史
B. 起病急,有饥饿感、多汗、心悸、手抖等交感神经兴奋的表现
C. 皮肤潮湿多汗,呼吸正常
D. 脉搏细速,血压下降
E. 尿糖阳性,尿酮阴性
69. 传染病法规定:甲类传染病要求发病后于
A. 2小时内上报
B. 4小时内上报
C. 6小时内上报
D. 8小时内上报
E. 10小时内上报
70. 患者,男性,22岁。因高热、腹泻住院,确诊为伤寒。现体温下降,症状逐渐减轻。此时,应特别警惕的并发症是
A. 癫痫
B. 胃溃疡
C. 肠穿孔
D. 视网膜炎
E. 呼吸衰竭
71. 以下不属于 TIA 临床特征的是
A. 发病突然
B. 持续时间短暂,一般 10~15 分钟
C. 最长不超过 24 小时
D. 遗留神经功能缺损体征
E. 多有反复发作的历史
72. 脑部基底节出血的典型表现是
A. 交叉性瘫痪
B. 眼球震颤
C. 中枢性高热
D. 失语
E. “三偏综合征”
73. 患者,男性,56岁。有高血压病史,早晨因用力排便突然出现头痛、呕吐、右侧肢体偏瘫,CT 示高密度影。该患者最可能的诊断是
A. 脑出血
B. 脑血栓形成
C. 癫痫
D. 脑栓塞
E. 帕金森病
74. 吉兰—巴雷综合征患者的主要护理问题是

- 低效型呼吸,其主要原因是
- 面神经炎
 - 延髓麻痹
 - 呼吸肌麻痹
 - 肺部感染
 - 周围性面瘫
75. 患者,男性,20岁。患流行性乙型脑炎,并出现中枢性呼吸衰竭,应立即静脉滴注的是
- 碳酸氢钠
 - 生理盐水
 - 20%甘露醇
 - 去甲肾上腺素
 - 低分子右旋糖酐
76. 阿托品治疗有机磷农药中毒可消除的症状是
- 呼吸困难
 - 肌肉抽搐
 - 血压升高
 - 心率加快
 - 呼吸肌麻痹
77. 慢性肾盂肾炎患者经中西医结合治疗,尿常规检查已正常。为判断该病是否治愈,应做的检查是
- 复查尿常规
 - 尿沉渣涂片检查
 - PSP 排泌试验
 - 12 小时尿细胞计数
 - 清洁中段尿培养
78. 急性肾小球肾炎患儿出现严重循环充血时,首选的药物是
- 强心药
 - 降压药
 - 利尿药
 - 抗感染药
 - 扩张血管药
79. 胃镜检查术后护理措施不妥的是
- 术后禁食 1 天,防止胃扩张
 - 嘱患者不要用力咳嗽
 - 术后可按摩腹部,减轻腹胀
 - 不要吞唾液,以免呛咳
 - 检查后可出现咽痛等症状,嘱患者不要紧张
80. 三腔管使用过程中发生窒息的最主要原因是
- 牵引过紧
 - 喉头水肿
 - 气道炎症
 - 胃气囊破裂阻塞咽喉
 - 血液反流入气管
81. 患儿,两岁。因肺炎伴急性心力衰竭需立即进行抢救,首选的药物是
- 地高辛口服
 - 洋地黄肌内注射
 - 毛花苷 C 缓慢静脉注射
 - 硝普钠静脉点滴
 - 酚妥拉明静脉点滴
82. 患者,男性,43岁。因反复咯血收住入院。患者平时无咳嗽、咳痰、乏力、盗汗、低热等。考虑支气管扩张可能。为明确诊断,应进行的检查是
- 痰细菌学培养
 - 胸部 X 线检查
 - 胸部 CT
 - 纤维支气管镜

- E. 支气管造影
83. 呼吸衰竭患者保持呼吸道通畅, 维护呼吸功能的重要环节是
- 清除积痰
 - 加压吸氧
 - 使用呼吸兴奋剂
 - 控制呼吸道感染
 - 纠正酸碱平衡紊乱
84. 对行纤维支气管镜检查的患者, 术前半小时内应皮下注射
- 阿托品
 - 麻黄碱
 - 利多卡因
 - 肾上腺素
 - 异丙肾上腺素
85. 血气分析标本的采集方法, 正确的是
- 大多取肘静脉血
 - 一般取 0.5ml 血
 - 选用 1ml 干燥注射器
 - 注射器需用利多卡因润滑内壁
 - 拔出针头后立即送检
86. 对行胸腔闭式引流患者的护理措施正确的是
- 引流瓶处于胸腔上位置
 - 绝对限制患者翻身
 - 绝对限制患者咳嗽
 - 每天进行数次手臂和全范围关节活动
 - 若胸腔引流管不慎滑出胸腔时, 应迅速用干纱布将伤口覆盖, 嘱病人吸气, 并立即通知医生
87. 过敏性紫癜最常见的类型是
- 腹型
 - 紫癜型
 - 关节型
 - 肾型
 - 混合型
88. 急性白血病患者出现感染的主要原因是
- 长期营养不良
 - 白细胞增多
 - 淋巴细胞增多
 - 成熟粒细胞减少
 - 人体免疫力下降
89. 目前根治慢性粒细胞白血病的唯一方法是
- 中药治疗
 - 免疫治疗
 - 放射治疗
 - 化学治疗
 - 骨髓移植
90. 引起再生障碍性贫血最常见的药物是
- 氯霉素
 - 磺胺药
 - 保泰松
 - 阿司匹林
 - 苯妥英钠
91. 目前治疗原发性肝癌的最好方法是
- 手术治疗
 - 放射治疗
 - 全身化疗
 - 生物治疗
 - 肝动脉栓塞化疗
92. 肝癌非手术治疗的首选方法是
- 中医治疗

- B. 放射治疗
C. 全身化疗
D. 生物治疗
E. 肝动脉栓塞化疗
93. 诊断膀胱破裂最简易的方法是
A. 耻骨上膀胱穿刺
B. 腹腔穿刺
C. 膀胱镜检查
D. 导尿及膀胱注水试验
E. CT 检查
94. 男性, 40 岁, 因骑跨伤致排尿困难, 尿道流血入院, 诊断首先考虑为
A. 前尿道断裂
B. 输尿管损伤
C. 肾裂伤
D. 膀胱破裂
E. 后尿道断裂
95. 以下何种病症不是肾、输尿管结石常见的
A. 腰痛和镜下血尿
B. 肾绞痛时伴有恶心、呕吐
C. 尿中有红细胞、白细胞
D. 肾绞痛时向下肢、外阴部和大腿内侧放射
E. 无痛性肉眼可见的血尿伴有条状血块
96. 男性, 40 岁, 发现右肾多发结石, 左肾盂结石直径 1.2cm, 当发生肾绞痛时, 护士可准备哪些药物
A. 盐酸哌替啶 +654(II)
B. 吗啡
C. 安痛定
D. 苯巴比妥钠
E. APC
97. 下列哪种疾病的病理改变主要在肾, 而临床表现是膀胱
A. 肾肿瘤
B. 肾结石
C. 急性肾盂肾炎
D. 肾结核
E. 肾脓肿
98. 男性, 50 岁, 肾结核。拟行一侧肾全肾切除术, 术前抗结核治疗至少要
A. 1 周
B. 2 周
C. 3 周
D. 1 个月
E. 2 个月
99. 目前最常用的治疗前列腺增生的手术方式是
A. 耻骨上经膀胱前列腺摘除术
B. 耻骨后前列腺摘除术
C. 经会阴前列腺切除术
D. 经尿道前列腺电切术
E. 前列腺激光切除术
100. 男性, 65 岁, 前列腺增生症并发尿潴留, 做膀胱造影术时, 护士应提供
A. 普通橡胶导尿管
B. 前列腺导尿管
C. 蕈状导尿管
D. 气囊导尿管
E. 金属导尿管
101. 肾癌三联症是指
A. 血尿、发热、肿块
B. 腰痛、肿块、血尿
C. 尿急、尿频、尿痛

- D. 腰痛、血尿、血压升高
E. 发热、血沉快、血压升高
102. 下列有关肾细胞癌的描述错误的是
A. 肾癌患者可以出现间歇或持续性低热
B. 肾癌患者可以发生低血钙
C. 肾癌患者可以出现高血压
D. 肾癌患者可以出现红细胞计数增多
E. 肾癌患者可以出现腰痛
103. 主要措施是通过强力杀灭精子达到节育目的的节育方法是
A. 输精管结扎术
B. 节育环
C. 输精管注射绝育法
D. 避孕套
E. 外用避孕药膜
104. 男性, 45岁, 在刺激下对性交无兴趣, 且无主动性要求。考虑其表现为
A. 勃起功能障碍
B. 射精功能障碍
C. 早泄
D. 性欲改变
E. 阳痿
105. 原发性醛固酮增多症出现的代谢紊乱为
A. 高血钾
B. 尿钾排出增加
C. 高血浆肾素
D. 低尿钾
E. 血醛固酮水平降低
106. 男性, 60岁, 患皮质醇症而入院, 此病患者在活动时应注意防止因骨质疏松而引起的
A. 肌萎缩
B. 病理性骨折
C. 股部皮肤紫纹
D. 四肢无力
E. 性腺功能紊乱
107. 骨折牵引时, 下列措施中能预防过度牵引的是
A. 患肢抵床尾
B. 患肢功能锻炼
C. 定时测定肢体长度
D. 防止牵引针左右移动
E. 定时放松牵引装置
108. 自身力量不足, 需要外力协助, 尤其在起动的需要帮助的骨折病人, 应采用的功能锻炼方法为
A. 主动运动
B. 被动运动
C. 助力运动
D. 手法治疗
E. 肌肉等动收缩
109. 脊髓半切征病人损伤对侧肢体的
A. 痛觉和温觉丧失
B. 深感觉和温觉丧失
C. 运动和痛觉丧失
D. 运动和温觉丧失
E. 运动和深感觉丧失
110. 杜加试验(Dugas征)阳性可见于
A. 肩关节脱位
B. 肘关节脱位
C. Colles骨折
D. 肱骨髁上骨折
E. 锁骨骨折

111. 骨折临床愈合后,骨痂的改造塑型主要取决于
- 外固定的牢固性
 - 肢体活动和负重所形成的应力
 - 局部血液供应情况
 - 骨痂的多少
 - 是否很好地配合理疗、按摩及药物治疗
112. 急性血源性骨髓炎的早期诊断中,最主要的依据是
- 全身中毒症状严重
 - 局部持续性疼痛,患肢不愿活动
 - 骺端处明显深压痛
 - 白细胞计数增多
 - 骨髓穿刺抽得脓性液体,查有化脓菌
113. 女性,12岁,X线片见第9胸椎体破坏,椎体压缩成楔形,椎弓根阴影仍清晰可见,最可能的诊断为
- 压缩性骨折
 - 脊柱结核
 - 脊柱肿瘤
 - 化脓性脊椎炎
 - 先天性脊柱畸形
114. 腰椎间盘突出症出现鞍区麻木,二便功能障碍,系突出间盘压迫
- 脊髓
 - 脊髓圆锥
 - 马尾神经
 - 骶1神经根
 - 骶2神经根
115. 颈椎病行前路手术及植骨椎体融合术后的护理最应重视
- 颈前屈位,两侧颈肩放置沙袋
 - 观察生命征
 - 注意伤口出血,密切观察呼吸状态
 - 加强心理护理
 - 预防并发症
116. 男性,36岁,因脊髓型颈椎病接受手术治疗,对其出院指导中正确的是
- 避免猛力转头动作
 - 告诉患者1~2周后症状即可完全消失
 - 乘坐高速行驶的汽车时,应面对正前方或正后方而坐
 - 日常生活中减少颈部活动,尽量保持颈部固定
 - 枕头高度以头颈部未压上时有一拳高为宜
117. 恶性骨肿瘤的X线表现主要为
- 边缘不清楚,骨质破坏,骨膜反应明显
 - 边缘清楚,骨质破坏,骨膜反应明显
 - 边缘不清楚,骨质破坏,无骨膜反应
 - 边缘不清楚,骨质增生,无骨膜反应
 - 边缘清楚,骨质增生,无骨膜反应
118. X线片表现为“葱皮状”反应性骨形成主要见于
- 软骨肉瘤
 - 尤文肉瘤
 - 恶性骨巨细胞瘤
 - 骨髓瘤
 - 骨转移性肿瘤
119. 本琼蛋白对诊断下列哪一种骨肿瘤具有重要意义
- 骨肉瘤
 - 尤文肉瘤
 - 多发性骨髓瘤
 - 软骨肉瘤

E. 脊索瘤

120. Codman 三角 X 线表现主要见于

A. 骨肉瘤

B. 软骨肉瘤

C. 纤维肉瘤

D. 恶性骨巨细胞瘤

E. 骨髓瘤

二. 多选题(60分,每题2分)

1. 席尔提出一般适应综合征包括以下哪个发展阶段

A. 评价期

B. 警告期

C. 抵抗期

D. 耗竭期

E. 疲溃期

2. 共同参与型护患关系模式包括下列哪些特点

A. 双向性关系

B. 心理方位为等位

C. 护士在护患关系中占主导地位

D. 特征为护士帮助服务对象自我恢复

E. 以生物医学—社会心理模式及健康为主导思想

3. Adamas 认为评判性思维是

A. 收集资料,创造性地提出护理诊断和干预措施

B. 使护理计划个体化的逻辑思维过程

C. 使护理计划精确化的逻辑思维过程

D. 使护理计划个体化的认知过程

E. 使护理计划精确化的认知过程

4. 长期卧床患者常可诱发的并发症有

A. 肾结石

B. 压疮

C. 肺淤血

D. 坠积性肺炎

E. 静脉血栓

5. 采用局部吹氧法治疗压疮,以下叙述正确的是

A. 氧流量为 5~6L/min

B. 每日 1 次

C. 每次 15 分钟

D. 对分泌物较多的疮面,可在湿化瓶中加 75%乙醇

E. 治疗完毕,疮面必须用无菌纱布覆盖

6. 下列关于睡眠时相的描述,正确的是

A. 慢波睡眠又称正相睡眠

B. 成人进入睡眠后,首先是慢波睡眠

C. 越接近睡眠的后期,快波睡眠持续时间越长

D. 两种睡眠时相状态均可直接转为觉醒状态

E. 在觉醒状态下,不能进入慢波睡眠

7. 医院感染中常见的易感宿主有

A. 大面积烧伤患者

B. 肝脏移植患者

C. 心脏介入手术患者

D. 长期放化疗患者

E. 早产儿

8. 下面属于给药“五个准确”的是

A. 准确的药物

B. 准确的剂量

C. 准确的途径

D. 准确的时间

E. 准确的医嘱

9. 用药前必须做过敏试验的药物是
- 细胞色素 C、普鲁卡因
 - 四环素、红霉素
 - 泛影葡胺、破伤风抗毒素
 - 洋地黄、山梨醇
 - 链霉素、碘化物
10. 下列关于 ARDS 的描述正确的是
- 是由各种致病因素导致的急性、进行性呼吸困难
 - 呼吸窘迫和顽固性低氧血症为其主要临床特征
 - 通气不足是导致低氧血症的主要机制
 - 肺泡渗出液中含有大量的蛋白质
 - 抗炎介质释放过多可能与 ARDS 的发生和发展有关
11. 机械通气病人可能出现的呼吸机故障有
- 气管插管脱出
 - 气管插管滑入右主支气管
 - 黏痰堵塞人工气道
 - 单向活瓣方向装反
 - 呼吸机管道扭曲
12. 关于容积控制通气,正确的说法是
- 呼吸机完全替代病人自主呼吸
 - 气道压力完全由呼吸机控制
 - 呼吸频率完全由呼吸机控制
 - 潮气量完全由呼吸机控制
 - 不能用于有自主呼吸的病人
13. 下列呼吸机通气模式中,可以由病人自主呼吸触发的通气模式为
- 压力支持通气
 - 压力控制通气
 - 辅助控制通气
 - 容积控制通气
 - 间歇强制通气
14. 无创通气的缺点有
- 易造成单侧肺通气
 - 密闭不好,容易漏气
 - 易发生人机对抗
 - 容易移位、脱出
 - 不能完全代替自主呼吸
15. 经鼻气管插管的优点有
- 易于插入,适合于急救
 - 病人易于接受
 - 气道阻力小
 - 留置时间长
 - 便于口腔护理
16. 有下列哪些情况存在时,宜尽早建立人工气道,进行人工通气
- 严重呼吸衰竭和 ARDS 病人经积极治疗,情况无改善甚至恶化
 - 哮喘急性发作病人呼吸频率 >30 次/分
 - 重症肺炎病人经高流量给氧后 $\text{PaO}_2 45\text{mmHg}$
 - 军团菌肺炎病人神志不清,意识逐渐模糊
 - 心源性肺水肿病人自主呼吸微弱
17. 以下关于心源性水肿特点的叙述正确的有
- 多出现在身体下垂部位
 - 在下午加重
 - 多出现在颜面部
 - 晨起加重
 - 重者伴胸水、腹水
18. 循环系统疾病引起胸痛的原因包括
- 心绞痛

- B. 心肌梗死
C. 急性主动脉夹层
D. 急性心包炎
E. 心血管神经症
19. 夜间阵发性呼吸困难的发作与下列哪些发病机制有关
- A. 静脉回心血量增加
B. 平卧时膈肌上升,肺活量减少
C. 夜间迷走神经兴奋性增高
D. 熟睡时对缺氧更敏感
E. 夜间机体耗氧量增加
20. 常用的保钾利尿剂有
- A. 氢氯噻嗪
B. 呋塞米
C. 螺内酯
D. 氨苯蝶啶
E. 阿米洛利
21. 使心肌收缩力增强的药物有
- A. 洋地黄
B. 合心爽
C. 氨力农
D. 米力农
E. 普萘洛尔
22. 全胃肠外营养支持病人可能发生的代谢性并发症有
- A. 低血糖
B. 空气栓塞
C. 导管败血症
D. 肝胆系统损害
E. 高渗性非酮性昏迷
23. 中心静脉插管所致的并发症为
- A. 气胸
B. 血胸
C. 出血
D. 败血症
E. 臂丛神经损伤
24. 菌血症的主要治疗措施包括
- A. 正确处理创面
B. 全身支持治疗
C. 联合应用抗生素
D. 大量应用激素
E. 局部切开引流
25. 气性坏疽局部表现为
- A. 患肢胀裂样疼痛
B. 明显肿胀
C. 伤口恶臭
D. 皮下气肿
E. 伤口有浆液血性液体流出
26. 影响伤口愈合的因素包括
- A. 低蛋白血症
B. 使用糖皮质激素
C. 糖尿病
D. 伤口有异物
E. 局部感染
27. 烧伤的严重程度取决于
- A. 热力的强度
B. 烧伤面积的大小
C. 热力与组织接触的时间
D. 烧伤的深度
E. 病人的感受
28. 排斥反应的表现有
- A. 皮肤苍白,温度下降

- B. 发热、血压增高、情绪异常
- C. 局部肿胀、疼痛
- D. 尿少
- E. 神经功能障碍

29. 属于器官移植的是

- A. 输血
- B. 肾移植
- C. 肝移植

三. 问答题(案例分析 60 分, 每题 20 分)

(一) 周女士, 45 岁。因“风心病、房颤”入院, 主诉心悸、头晕、胸闷、四肢乏力, 护士为其诊脉时发现脉搏细速、不规则, 同一单位时间内心率大于脉率, 听诊心率快慢不一, 心律完全不规则, 心音强弱不等。

1. 此脉搏称为

- A. 缓脉
- B. 间歇脉
- C. 绀脉
- D. 洪脉
- E. 丝脉

2. 此脉搏属于

- A. 频率异常
- B. 次数异常
- C. 节律异常
- D. 强弱异常
- E. 动脉壁异常

3. 正确测量脉搏的方法是

- A. 先测脉率, 再测心率
- B. 护士测脉率, 医生测心率
- C. 一人同时测脉率和心率
- D. 一人听心率, 一人测脉率, 同时测一分钟

- D. 脂肪移植
- E. 血管移植

30. 肿瘤的内源性因素包括

- A. 物理性
- B. 遗传
- C. 内分泌
- D. 免疫
- E. 种族

E. 一人测脉率, 一人计时

(二) 男, 41 岁。因胃溃疡行胃部分切除术后半年, 自觉饭后有上腹饱胀不适、腹胀等消化不良现象, 伴 II 区血一次, 量少。体检: 上腹轻压痛。诊断为“急性胃炎”。

1. 引起此病的主要病因是

- A. 手术应激
- B. 饮食不当
- C. 幽门螺杆菌
- D. 胆汁反流
- E. 自身免疫反应

2. 主要护理措施不包括

- A. 寻找病因
- B. 感轻度不适时应禁食, 以免加重胃的负担
- C. 卧床休息
- D. 加强心理疏导, 消除恐惧
- E. 进温热半流质饮食

3. 急性胃炎引起上消化道出血, 下列哪一项不符合诊断

- A. 呕吐咖啡色液体
- B. 柏油样便

- C. 出血呈间歇性
- D. 出血量大
- E. 鲜血便

(三)患者,男性,25岁。1小时前头部受伤,无昏迷,无恶心、呕吐。检查:鼻腔有血性液体流出,眼眶周围及球结膜下广泛淤血斑。

1. 该患者最可能的诊断是
- A. 脑震荡
 - B. 颅底骨折
 - C. 脑挫裂伤
 - D. 头皮裂伤
 - E. 脑血管破裂

2. 上述患者的诊断主要依靠
- A. 头部受伤史
 - B. 颅底 X 线摄片
 - C. 头部 CT
 - D. 头部 MRI
 - E. 临床表现

3. 上述患者的护理措施错误的是
- A. 取半坐卧位
 - B. 严密观察意识、生命体征
 - C. 从鼻腔滴入止血药
 - D. 预防性应用抗生素
 - E. 避免用力排便

参考答案

单选题

- | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. C | 2. B | 3. B | 4. A | 5. E | 6. C | 7. D | 8. B | 9. D | 10. D |
| 11. C | 12. D | 13. D | 14. E | 15. B | 16. D | 17. A | 18. B | 19. C | 20. C |
| 21. B | 22. E | 23. A | 24. D | 25. C | 26. A | 27. C | 28. E | 29. D | 30. D |
| 31. A | 32. E | 33. E | 34. E | 35. D | 36. E | 37. C | 38. B | 39. B | 40. E |
| 41. C | 42. A | 43. A | 44. A | 45. D | 46. E | 47. C | 48. A | 49. A | 50. B |
| 51. E | 52. B | 53. E | 54. E | 55. A | 56. C | 57. A | 58. C | 59. D | 60. E |
| 61. E | 62. B | 63. E | 64. D | 65. E | 66. E | 67. D | 68. D | 69. C | 70. C |
| 71. D | 72. E | 73. A | 74. C | 75. C | 76. A | 77. E | 78. C | 79. A | 80. D |
| 81. C | 82. E | 83. A | 84. A | 85. E | 86. D | 87. B | 88. D | 89. E | 90. A |
| 91. A | 92. E | 93. D | 94. A | 95. E | 96. A | 97. D | 98. B | 99. D | 100. C |
| 101. C | 102. B | 103. E | 104. D | 105. B | 106. B | 107. C | 108. C | 109. A | 110. A |
| 111. B | 112. E | 113. B | 114. C | 115. C | 116. A | 117. A | 118. B | 119. C | 120. A |

多选题

- | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|----------|
| 1. BCD | 2. ABDE | 3. ABC | 4. ABDE | 5. ACD | 6. ABCD | 7. ABCDE |
| 8. ABCD | 9. ACE | 10. BD | 11. ABCDE | 12. ACDE | 13. ACE | 14. BCE |
| 15. BDE | 16. ACDE | 17. ABE | 18. ABCDE | 19. ABC | 20. CDE | 21. ACD |
| 22. AD | 23. ABCDE | 24. ABC | 25. ABCDE | 26. ABCDE | 27. BD | 28. BCD |

29. BC 30. BCDE

问答题

(一) 1. C 2. C 3. D

(二) 1. D 2. B 3. E

(三) 1. B 2. E 3. C